



נותרו שולי בטחון צרים לפני צורך בהחמרה אולם יש להעריך כבר עתה לשיפור משמעותי בשולי הבטחון וביכולת הכלת המגפה.

1. הצורך בהחמרת צעדי המנע, העולה מהדיון הציבורי, נובע מהרצון להקטין את העליה בקצב התחלואה בדחיפות, לצד הצורך לשמור על יכולת מערכת הבריאות לעמוד במשימת טיפול בבריאות הציבור.

2. בימים האחרונים ניכרת האטה בקצב עליית מספר הנדבקים המזוהים. אם עד תחילת השבוע הנוכחי מספר הנדבקים המזוהים עלה בקצב המכפיל את עצמו בכל 10 ימים, הרי שכעת זמן ההכפלה של עלה משמעותית (מעל 15 ימים להכפלה). (א) הקצב עדיין גבוה, ויש צורך להקטין, כי כמות החולים היומית גבוהה. (ב) עם זאת, ייתכן שההאטה בקצב נובעת מאיסור ההתקהלויות. איסור זה הוטל ב-5/7, ומומש לחלוטין ב-8/7. לפיכך, צעד זה עדיין לא נתן את מלוא אותותיו. רצוי לתת לצעד זה למצות את עצמו לפני שמטילים מגבלות חמורות על הציבור (וגביית מחיר כלכלי וחברתי כבד).

3. העומס על בתי החולים כתוצאה מהמגיפה מתבטא במספר המאושפזים, שניתן לנטר בצורה יציבה באמצעות מספר החולים הבינוני-קשה. קצב העלייה של פרמטר זה נשאר יציב וגבוה. מספר החולים האלו גדל כרגע בהכפלה כל 9-10 ימים. (א) בקצב הזה, בתחילת השבוע הבא נגיע לכ-400 חולים בינוני-קשה, ולפני סוף החודש לכ-800 חולים, מה שיסמן תחילת תהליך הדרדרות של יכולת הטיפול של בתי החולים, שתוביל לתמותה מוגברת. הערכה היא שהגעה ל-1600 חולים בינוני-קשה תוביל למשבר חמור של בתי החולים.

(ב) **מניעת הגעה ל-800 חולים בינוני-קשה דורשת נקיטת צעדי מנע חמורים בתחילת שבוע הבא.**

4. ניתן להמתין לתחילת השבוע הבא לפני החמרה, ויש מגוון אפשרויות לצעדים שונים לפני סגר שניתן לשקול לבצע כעת – כגון מיצוי יכולת עבודה מהבית, צמצום נוסף של התקהלויות במקומות סגורים (כולל תפילה) ועוד.

5. צמצום הדבקה ע"י בדיקות, זיהוי חולים, תחקור ובידוד – מסייע בכל שלב בצמצום משמעותי במקדם ההדבקה. לפיכך, יש להשקיע בשדרוג מידי של יכולות קטיעת שרשראות אפקטיבית בכל תרחיש, בהתפרצות הנוכחית ובהתפרצויות עתידיות.

6. **נקודה עיקרית לטיפול דחוף - יש להעריך מיידית ליכולת טיפול במקרה של המשך האצת תחלואה בקצב הנוכחי - כ 1000 חולים קשה+בינוני בסוף החודש.** הגדלה מיידית של שולי הבטחון של מערכת הבריאות באמצעות:

1. ניהול שעת חירום של הטיפול במגפה - ניהול מרכזי.
2. הערכות בתי חולים (דחיית טיפולים אלקטיביים וכד').
3. הגדלת קיבול מלוניות למניעת הדבקה במשפחה.
4. תו"ל רפואי למלוניות: הקצאת אחות+רופא למיון ראשוני לפני אשפוז בבית חולים, מדיניות בדיקות לשחרור.